



SIMPÓSIO INTERNACIONAL

SÃO PAULO 2025

TEMA CENTRAL:
NEURO ONCOLOGIA

**SUMÁRIOS DOS TRABALHOS
POR ORDEM ALFABÉTICA**



SUMÁRIO DOS TRABALHOS POR ORDEM ALFABÉTICA

A LAMININ-BASED THERAPY FOR DOGS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY: PROMISING RESULTS OF A LONGITUDINAL TRIAL

ABORDAGEM ADAPTADA DA MEDICINA HUMANA PARA SCALP BLOCK EM CÃO SUBMETIDO A CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA: relato de caso

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DE MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃO

ACESSO transcortical DO GIRO FRONTAL PARA REMOÇÃO DE MENINGIOMA PSAMOMATOSO CÍSTICO EM CÃO: RELATO DE CASO

ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRANIANA EM CÃES DA RAÇA BULLDOGUE FRANCÊS

ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRANIANA EM FELINOS: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE CASUÍSTICA

ADENOMA CROMÓFOBO DE *PARS DISTALIS* EM UM FELINO

ASTROCITOMA DIFUSO DE GRAU 2: RELATO DE CASO COM RECIDIVA TUMORAL E REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA

AVALIAÇÃO DO PEPTÍDEO “NEUROVESPINA” COMO TERAPIA ADJUVANTE EM CÃES COM EPILEPSIA IDIOPÁTICA REFRATÁRIA

CARCINOMA METASTÁTICO DE ORIGEM DESCONHECIDA EM COLUNA VERTEBRAL DE CÃO: RELATO DE CASO

CISTO EXTRADURAL EM FELINO - RELATO DE CASO

CORTICOTOMIA EM ACESSO SUPRAZIGOMÁTICO NA ABORDAGEM DE NEOPLASIA DE BASE DE CRÂNIO EM UM CÃO: RELATO DE CASO E APLICABILIDADE

CRANIOTOMIA FRONTOPARIETAL PARA RESSECÇÃO TOTAL DE MENINGIOMA TRANSICIONAL NO GIRO SILVIANO COM ACOMPANHAMENTO DE 1520 DIAS

CRANIOTOMIA ROSTROTENTORIAL PARA REMOÇÃO DE EXTENSO MENINGIOMA TRANCISIONAL EM LOBOS PARIETAL E TEMPORAL EM CÃO: RELATO DE CASO

CRANIOTOMIA TRANSFRONTAL PARA REMOÇÃO DE MENINGIOMA TRANSICIONAL SÓLIDO CÍSTICO COM ÁREA DE CALCIFICAÇÃO: RELATO DE CASO

CRISES EPILEPTICAS SERIADAS SECUNDÁRIAS À ERITROCITOSE PRIMÁRIA FELINA: RELATO DE CASO

DESAFIO DIAGNÓSTICO DE VESTIBULOPATIA CENTRAL FELINA SECUNDÁRIA A LESÃO DO TRIGÊMEO: RELATO DE CASO

SUMÁRIO DOS TRABALHOS POR ORDEM ALFABÉTICA

DISCINESIA PAROXÍSTICA EM 31 CÃES (2020-2025)

DISSEMINATED *Sarcocystis* *neurona* INFECTION CAUSING
MENINGOENCEPHALOMYELITIS AND MYOSITIS IN A DOG: A FIRST CONFIRMED CASE
IN SOUTH AMERICA

FAM134B GENE MUTATION SENSORY NEUROPATHY IN TWO BORDER COLLIE
SIBLINGS

FIBROSSARCOMA CERVICAL INTRA-DURAL E EXTRA-MEDULAR EM CÃO: RELATO DE
CASO COM RESSECÇÃO CIRÚRGICA

GANGLIOCITOMA ENCEFÁLICO EM CÃES ASSOCIADO À EPILEPSIA: RELATO DE DOIS
CASOS

GANGLIONEURITE IDIOPÁTICA HIPERTRÓFICA BILATERAL EM UM CÃO : RELATO DE
CASO

GLIOMA EM SEGMENTO MEDULAR CERVICOTORÁCICO DE FELINO DOMÉSTICO

GRANULOMA FÚNGICO EM CEREBELO DE UM CÃO – RELATO DE CASO

HEMATOMA INTRA-AXIAL COM EFEITO DE MASSA E SINAIS AGUDOS PROGRESSIVOS
REMOVIDO CIRURGICAMENTE VIA ACESSO ROSTROTENTORIAL EM CÃO: RELATO DE
CASO

HEMORRAGIA SUBDURAL APÓS DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL EM CÃO
COM HIDROCEFALIA CONGÊNITA: RELATO DE CASO

HIPOFISECTOMIA POR ACESSO TRANSESFENOIDAL PARA RESSECÇÃO DE
MACROADENOMA HIPOFISÁRIO EM CÃO COM AUXÍLIO DA MICROSCOPIA
CIRÚRGICA: RELATO DE CASO

K2-EDTA: UNSUITABLE PRESERVATIVE FOR CANINE CEREBROSPINAL FLUID

MAPEAMENTO DAS FASES DO SONO POR POLISSONOGRAFIA EM EQUINOS: NOVAS
PERSPECTIVAS SOBRE A ELETROENCEFALOGRAFIA

MENINGOENCEFALITE POR PARVOVÍRUS EM CÃO: RELATO DE CASO

METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA PULMONAR ACINAR PRIMÁRIO PARA
CEREBELO E CÓRTEX PARIETAL EM UM CÃO – RELATO DE CASO

MIELIETE NÃO-INFECCIOSA RESPONSIVA A CORTICÓIDE EM FELINO DOMÉSTICO



SUMÁRIO DOS TRABALHOS POR ORDEM ALFABÉTICA

MIOSITE EXTRAOCULAR EM CÃO DE RAÇA ROTTWEILER: RELATO DE CASO

NARCOLEPSIA ASSOCIADA A TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO EM CÃO: RELATO DE CASO

NEOPLASIA ADRENAL FUNCIONAL CAUSANDO MIOPATIA DE CUSHING EM CÃO: RELATO DE CASO

NEOPLASIA INTRACRANIANA POUCO DIFERENCIADA EM CÃO JOVEM: DIAGNÓSTICO DESAFIADOR E CONTRIBUIÇÃO DO ONCOMAPA

NEOPLASIAS ESPINHAIS EM CÃES: ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS E PATOLÓGICOS

NEUROLINFOMATOSE COM ACOMETIMENTO MÚLTIPLO DE NERVOS PERIFÉRICOS EM FELINO: DIAGNÓSTICO POR BIÓPSIA DE NERVO ISQUIÁTICO

NEURÓLISE EM NERVO ISQUIÁTICO PARA TRATAMENTO DE NEUROPATIA PÓS INJEÇÃO INTRAMUSCULAR

NISTAGMO RETRAÇÃO-CONVERGENTE SECUNDÁRIO A ACIDENTE VASCULAR ISQUÊMICO MESENCEFÁLICO EM CÃO - RELATO DE CASO

OSTEOSSARCOMA EXTRA ÓSSEO NO PLEXO BRAQUIAL CÃO: RELATO DE CASO

PNEUMOENCÉFALO PÓS-CRANIOTOMIA TRANSFRONTAL PARA REMOÇÃO DE GRANULOMA CICATRICIAL CRÔNICO EM CÃO: RELATO DE CASO

POLIMIOSITE SECUNDÁRIA A LEISHMANIOSE EM UM CÃO: RELATO DE CASO

POLYNEUROPATHY IN A DOG WITH CANINE LEISHMANIOSIS

PRESENÇA DE FORAMES TRANSVERSOS NA VÉRTEBRA C7 DE UM CÃO E DE UM GATO

PRIMEIRO CASO CONFIRMADO DE MIELOPATIA POR *GURLTIA PARALYSANS* EM GATO DOMÉSTICO NO ESTADO DO PARANÁ

RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA EM DOIS CURSOS NO TRATAMENTO DE MENINGIOMA INTRACRANIANO EM CÃO: SOBREVIDA DE CINCO ANOS – RELATO DE CASO

RECUPERAÇÃO NEUROLÓGICA EM 14 GATOS COM LINFOMA EPIDURAL TRATADOS COM QUIMIOTERAPIA



SUMÁRIO DOS TRABALHOS POR ORDEM ALFABÉTICA

RETROPERITONEAL NEUROENDOCRINE TUMOR WITH SPINAL CORD INVOLVEMENT IN A YOUNG GERMAN SHEPHERD DOG - A CASE REPORT

SACROCOCCYGEAL AGENESIS AND MENINGOCELE IN A YOUNG FEMALE MONGREL DOG – LONG-TERM (22 MONTHS) FOLLOW-UP NG GERMAN SHEPHERD DOG –

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MIELOPATIA CONSTRICTIVA E DIVERTÍCULO ARACNÓIDE EM PUG ATRAVÉS DE DESCOMPRESSÃO, DURECTOMIA E ESTABILIZAÇÃO VERTEBRAL UNILATERAL – RELATO DE CASO

TUMOR DE BAINHA DE PLEXO LOMBOSSACRAL SUBMETIDO À RADIOTERAPIA: RELATO DE CASO

TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO MEDULAR EM CADELA: RELATO DE CASO

TUMOR ÓSSEO MULTILOBULAR EM CRÂNIO REGIÃO OCCIPITAL: IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ASSOCIADA A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO CIRÚRGICO – RELATO DE CASO

ULTRASSONOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA NO AUXÍLIO DA CORREÇÃO DE BRAIN SHIFT EM RESSECÇÃO DE GLIOMA EM CÃO: relato de caso

UM NOVO DISPOSITIVO CIRÚRGICO PARA REMOÇÃO DE MATERIAL DISCAL DURANTE A FENESTRAÇÃO DO DISCO INTERVERTEBRAL

UNUSUAL TRANSIENT DYSPHONIA, DYSPHAGIA, AND MEGAESOPHAGUS FOLLOWING TRAUMATIC BRAIN INJURY IN A DOG: A CASE REPORT

VESTIBULOPATIA PERIFÉRICA CAUSADA POR CARCINOMA DE GLÂNDULA CERUMINOSA EM CÃO


VIAS DA SENSIBILIDADE DOLOROSA EM MODELO DIDÁTICO 3D: INTEGRAÇÃO DA MANUFATURA ADITIVA AO ENSINO DA NEUROANATOMIA VETERINÁRIA

A laminin-based therapy for dogs with chronic spinal cord injury: promising results of a longitudinal trial

Carolina de Miranda Chize, Diego Gonzales Dias, Karla Menezes, Max Nascimento Freire, Rodrigo Ferreira Pinto Jiddu, Tatiana Coelho-Sampaio

Introduction: Spinal cord injury (SCI) in dogs often leads to permanent loss of ambulation, particularly in severe thoracolumbar cases, for which no effective regenerative treatment currently exists. Laminin, a key extracellular matrix protein, supports axonal growth, and its polymerized form—polylaminin (polyLM)—has previously shown to promote neural regeneration and motor recovery in acute SCI models. Building on these findings, we conducted a longitudinal veterinary clinical trial to assess whether polyLM, combined with either glial cell–derived neurotrophic factor (GDNF) or chondroitinase ABC (ChABC), could safely improve gait function in dogs with chronic SCI. This study provides translational insights into the potential of laminin-based therapies to restore locomotion even in the chronic phase of spinal injury.

Materials and Methods: Six paraplegic dogs with chronic thoracolumbar SCI (T3–L3) caused by trauma (n=2) or intervertebral disc degeneration (n=4) were enrolled after ≥4 months of stable neurological deficits despite physiotherapy. Dogs were randomly allocated into two groups:
Group 1: PolyLM (1 µg/kg) + GDNF (50 µg)
Group 2: ChABC (5 U) + PolyLM (1 µg/kg)
Treatments were delivered intraspinal near the lesion site in two sessions one week apart. All dogs were followed for 6 months, receiving regular physiotherapy and monthly gait assessments using the Texas Spinal Cord Injury Scale (TSCIS) and Open Field Scale (OFS). Safety was monitored by neurological exams and serial blood tests (urea, creatinine, AST, ALT, total proteins, ALP). Statistical analysis: Changes in TSCIS and OFS scores were evaluated using a linear mixed-effects model (R v4.3.0; $p < 0.05$).



Gait performance improved significantly after treatment:

- TSCIS** scores increased from 2.2 ± 0.3 to 3.2 ± 0.4 ($p < 0.001$)
- OFS** scores increased from 1.5 ± 0.3 to 3.1 ± 0.4 ($p &$

ABORDAGEM ADAPTADA DA MEDICINA HUMANA PARA SCALP BLOCK EM CÃO SUBMETIDO A CRANIOTOMIA

DESCOMPRESSIVA: relato de caso

SILVA, A. F. F.¹; CERQUEIRA, L. V. F.²; SANTOS, M. R. S.²; SILVA, A. K. F. F.²; MENDES, L. T. A.³; VASCONCELOS, C. B.⁴

1-MV, Neurologia e Neurocirurgia Oncológica, Maceió – AL
2-Discente de medicina veterinária do Centro Universitário CESMAC, Maceió – AL
3-MV, Terapia Intensiva e Emergência, Maceió – AL
4-MV, Anestesiologia Veterinária, Maceió – AL
ayannefiremanvet@gmail.com

INTRODUÇÃO

O bloqueio do couro cabeludo (Scalp Block) é uma técnica de anestesia regional amplamente utilizada na neurocirurgia humana, especialmente em craniotomias em vigília. Na medicina veterinária, seu uso clínico é pouco descrito e unicamente relatado em cães por Schaldemose e Lehnus (2022), apesar de oferecer redução da necessidade de anestésicos gerais e opioides, proporcionando analgesia eficaz com menor impacto hemodinâmico e um despertar tranquilo.

OBJETIVO

Objetivou-se relatar a abordagem do Scalp Block para bloqueio do crânio em um cão de grande porte submetido à craniotomia para ressecção de tumor cerebral.

RELATO DE CASO

Paciente: Labrador Retriever, 12 anos de idade, 36kg.

Avaliação neurológica ➡ Queixa principal: convulsões ➡ Tomografia craniana



ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DE MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃO

BARROS, V.E.A.¹, FARES, N.B.² ; MATOS, B.D.² ; MOURA, V.M.B.D.¹

1-MV, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (EVZ-UFG). Goiânia-GO

2-MV, atendimento volante. Goiânia-GO

Vbarros.vet@gmail.com

O mieloma múltiplo é uma neoplasia de plasmócitos, caracterizada pela proliferação na medula óssea dessas células, com consequente osteólise, hiperproteinemia pela produção de imunoglobulinas, e pode levar a consequências clínicas neurológicas por compressão medular direta neoplásica ou fraturas patológicas vertebrais. O objetivo deste resumo é des

ACESSO TRANSCORTICAL DO GIRO FRONTAL PARA REMOÇÃO DE MENINGIOMA PSAMOMATOSO CÍSTICO EM CÃO: RELATO DE CASO

CAMERINI, Y. H.¹; CONELIAN, G. T.²; SOARES, T. S.³; MENDES, H. ⁴

1- MV, Pós-graduando em Neurologia e Neurocirurgia, UFAPE. São Paulo - SP

2- MV, Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, Centro Veterinário Ponta Porã. São Paulo - SP

3 – MV, Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, Centro Veterinário Ponta Porã. São Paulo – SP

4 – MV Especialista em Anestesiologia Veterinária. São Paulo – SP

YagoHerreramedvet@outlook.com

INTRODUÇÃO

Os meningiomas são os tumores cerebrais primários mais frequentemente visto em cães. Embora sejam classificados como neoplasias benignas de crescimento lento, a incidência da variante cística craniana varia entre 12% e 32%

ACHADOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRANIANA EM CÃES DA RAÇA BULLDOGUE FRANCÊS

ZOTELLI E.¹; KONNO, S.²; ABREU, F.³ ; RUFINO C.⁴

1-MV, Universidade Santo Amaro, UNISA. São Paulo - SP.
2-MV, Diretora, Hospital Veterinário Pet Care. São Paulo - SP.
3-MV, Abreu e Leal Serviços Diagnósticos. São Paulo - SP.
4-Graduanda, Faculdades Metropolitanas Unidas, São Paulo, SP
ca.rufcorrea@gmail.com



INTRODUÇÃO

A ressonância magnética (RM) craniana é uma ferramenta diagnóstica essencial na avaliação de condições neurológicas em cães. O objetivo deste estudo foi descrever e quantificar os principais achados em cães da raça Buldogue Francês submetidos a RM, a fim de estabelecer um panorama dos diagnósticos mais frequentes na população.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisados 56 exames (jan/2024 a jul/2025), sendo 89% machos e 11% fêmeas, com média etária de 5,7 anos. As alterações mais frequentes ocorreram na cavidade timpânica e auditiva (externo, médio e interno), observadas em 66% dos casos (37/56. Dentro desse grupo, os diagnósticos mais comuns estão destacados no gráfico a seguir.




Figura 1. Principais alterações de cavidade timpânica e auditiva.

Outras alterações também foram estimadas:

ADENOMA CROMÓFOBO DE *PARS DISTALIS* EM UM FELINO

MIELKE, J. F. S.1*, SANTI, E. M. T.2, RAUBER, J. S.1, CHAVES, J. N. F.1, SEKITA, A. M. T.1, FLORES, M. M.2, BECKMANN, D. V.3, MAZZANTI, A.3

1- MV, Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Veterinária (SNNV). Hospital Veterinário Universitário (HVU). Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria - RS

2- MV, Laboratório de Patologia Veterinária. HVU. Departamento de Patologia. UFSM. Santa Maria – RS

3- MV, SNNV. HVU. Departamento de Clínica de Pequenos Animais. UFSM

CISTO EXTRADURAL EM FELINO - RELATO DE CASO

AGUIAR, L. ¹ ; MOYA, L. F. A. ² ; TRIBUCCI, J. P. ³ ; REZK, S. S. ⁴ ; TOKUNAGA, N. S. ⁵ ; MESQUITA, L. R. ⁶ ; BRANDAO, C. V. S.⁶; QUITZAN, J. G. ⁶

¹ MV, Setor Cirurgia de Pequenos Animais, FMVZ-UNESP. Botucatu – SP; ² MV residente, FMVZ-UNESP. Botucatu – SP; ³ Graduanda em Medicina Veterinária FMVZ/UNESP. Botucatu – SP; ⁴ MV autônoma. Botucatu – SP; ⁵ MV autônoma. São Paulo – SP; ⁶ Profª Drª, FMVZ-UNESP. Botucatu – SP; l.aguiar@unesp.br

INTRODUÇÃO

- Condição incomum;
- Acúmulo de líquido no espaço intervertebral → compressão da medula ou das raízes nervosas.

OBJETIVO

- Descrever um cisto extradural em um felino, SRD, 1 ano e 4 meses, 4.7 kg, que após o procedimento cirúrgico encontra-se bem.

CRANIOTOMIA FRONTOPARIETAL PARA RESSECÇÃO TOTAL DE MENINGIOMA TRANSICIONAL NO GIRO SILVIANO COM ACOMPANHAMENTO DE 1520 DIAS

ABADE, J.S.¹; CONELIAN, G.T.²; ALADIC, K.M.³; CAMERINI, Y.H.⁴; CARVALHO, C.B.M.⁵; RAHAL, N.E.^{4,6}; SOARES, T.S.⁶

¹ Graduação em Medicina Veterinária UAM, São Paulo - SP
² Médico Veterinário, serviço de neurologia e neurocirurgia Centro Veterinário Ponta Porã, São Paulo – SP
³ Graduação em Medicina Veterinária FMU, São Paulo – SP
⁴ Pós graduação em neurologia e neurocirurgia UFAPE, São Paulo - SP
⁵ Graduação em Medicina Veterinária UNISA, São Paulo – SP
⁶ Médica Veterinária Trainee em neurologia e neurocirurgia, Centro Veterinário Ponta Porã, São Paulo – SP

juliaabade2603@gmail.com

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Neoplasias intracranianas são a principal causa de disfunção neurológica em animais de meia idade a idosos ². O meningioma transicional de grau 1 em cães é um tumor primário do sistema nervoso central, benigno e de crescimento lento ². Este estudo tem como objetivo rel

CRANIOTOMIA ROSTROTENTORIAL PARA REMOÇÃO DE EXTENSO MENINGIOMA TRANCISIONAL EM LOBOS PARIETAL E TEMPORAL EM CÃO: RELATO DE CASO

CRISES EPILEPTICAS SERIADAS SECUNDÁRIAS À ERITROCITOSE PRIMÁRIA FELINA: RELATO DE CASO

BARBOSA, G.S.S.¹ CUGNASCA. B.S.². FERREIRA, O.B.A.S³ ; KANAYAMA, K.K.; LUCAS. S.R.R.; NOWOSH. V.

1,2,3 - MV, Residente - FMVZ/USP

4- MV, Serviço de Clínica Médica - FMVZ/USP

5,6- MV, Docentes - Departamento de Clínica FMVZ/USP
gabrielabarbosa.neuro@gmail.com



DESAFIO DIAGNÓSTICO DE VESTIBULOPATIA CENTRAL FELINA SECUNDÁRIA A LESÃO DO TRIGÊMEO: RELATO DE CASO

ANDRADE, J. A.¹; HAYASHI, A. M.²

1 - MV. Pós Graduação – Departamento de Cirurgia- FMVZ/USP, São Paulo – SP;
2 – Prof. Dra. Departamento de Cirurgia – FMVZ/USP, São Paulo – SP
ludmila.jalaim@gmail.com.br

INTRODUÇÃO

A vestibulopatia é uma afecção neurológica caracterizada por sinais como inclinação de cabeça, ataxia e nistagmo, podendo haver também paralisia facial, alterações de consciência e déficits proprioceptivos. A distinção entre origem central e periférica é essencial para o diagnóstico diferencial. O nervo trigêmeo, responsável por funções sensoriais e motoras, pode ser acometido por causas neoplásicas, inflamatórias ou infecciosas.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso atípico de felino que apresentou sinais vestibulares súbitos e progressivos.

MATERIAL E MÉTODOS

DISCINESIA PAROXÍSTICA EM 31 CÃES (2020-2025)

RAUBER, J. S.¹, CHAVES, J. C.¹, MIELKE, J.¹, CHAVES, R.², POLIDORO D.³, WRZESINSKI, M. R.⁴, MAZZANTI, A.⁵; BECKMANN, D.V.⁵

1- MV, Pós-graduação em Medicina Veterinária, UFSM. Santa Maria – RS
2- MV, CENOV. Caxias do Sul - RS
3- Dipl ECVN, MV, AniCura. Bélgica – BE
4- MV, Neuroanimal, Chapecó – RS
5 - MV, Professor, UFSM. Santa Maria – RS

Julia.dsrauber@gmail.com

INTRODUÇÃO

A discinesia paroxística (DP) é um distúrbio do movimento caracterizado por episódios hipercinéticos involuntários, autolimitantes e recorrentes, que ocorrem sem perda de consciência ou sinais autonômicos.

OBJETIVO

Identificar cães com diagnóstico presuntivo de DP e descrever sua caracterização fenotípica, tratamento e evolução clínica.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram revisados os arquivos de cães atendidos em dois centros de neurologia veterinária no período de janeiro de 2020 a abril de 2025 com suspeita de DP.

Critérios de inclusão

- ✓ Ficha clínica e neurológica completas
- ✓ Acompanhamento mínimo de três meses
- ✓ Exame neurológico normal em todas as avaliações
- ✓ Vídeos das crises
- ✓ Determinação do diagnóstico presuntivo de DP por dois médicos veterinários

GANGLIONEURITE IDIOPÁTICA HIPERTRÓFICA BILATERAL EM UM CÃO: RELATO DE CASO

ANFILO, M. H.¹; GABRIEL, J

GLIOMA EM SEGMENTO MEDULAR CERVICOTORÁCICO DE FELINO DOMÉSTICO

SILVA, S. K.¹; CAMPOS, Y. G.<

GRANULOMA FÚNGICO EM CEREBELO DE UM CÃO – RELATO DE CASO

DAL POZZOLO, A. A.¹, WRSEZINSKI, M. R.², RAUBER, J. S.³, CH

HEMORRAGIA SUBDURAL APÓS DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL EM CÃO COM HIDROCEFALIA CONGÊNITA: RELATO DE CASO



MORAES. G. M , GOMES. L.F.M , CONELIAN, G.T

- 1 - MV, Pós Graduação em Neurologia Veterinária Bioethicus - São Paulo - SP
- 2 - MV, Departamento de Neurologia Veterinária, Centro Veterinário Ponta Porã - São Paulo - SP
- 3 - MV, Departamento de Neurocirurgia, Centro Veterinário Ponta Porã - SP
- giovanna.macedo.moraes@gmail.com

K2-EDTA: UNSUITABLE PRESERVATIVE FOR CANINE CEREBROSPINAL FLUID

RIBEIRO, L. S.^{1,3}; CASTEL, A.B.²; MESA, C.L.C.B.²; IARA, I. H. N.³; TORRES, B. B. J.³

1- MV, Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM. Unaí - MG, Brasil.
2- MV, Département des sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe-Québec, Canada.
3- MV, Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Goiânia - GO, Brasil.
e-mail do primeiro autor: luana.ribeiro@ufvjm.edu.br

Introduction

While EDTA is anecdotally applied

MIELIETE NÃO-INFECCIOSA RESPONSIVA A CORTICÓIDE EM FELINO DOMÉSTICO

TOURINHO, T.P.¹; JANKOVITZ, M. E.C.¹; LOBO, L. G. L.²; CHIMENES, N.D.¹

NEOPLASIAS ESPINHAIS EM CÃES: ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS E PATOLÓGICOS

SEKITA, A. M. T.¹, CHAVES, R. O.², RAUBER, J. S.³, CHAVES, J. N. F.¹, KOMMERS, G. D.³, FLÔRES, M. M.⁴, MAZZANTI, A.³, BECKMANN, D. V.⁴

1- MV, Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Veterinária (SNNV) - Hospital Veterinário Universitário(HVU), Pós-graduação em Medicina Veterinária, UFSM. Santa Maria – RS - miwa.sekita@acad.ufsm.br
2- MV, CENOV. Caxias do Sul - RS
3- MV, SNNV-HVU, Professor titular, UFSM. Santa Maria – RS
4- MV, SNNV-HVU, Professor adjunto, UFSM. Santa Maria – RS

INTRODUÇÃO

NEOPLASIAS ESPINHAIS EM CÃES: ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS E PATOLÓGICOS

SEKITA, A. M. T.¹, CHAVES, R. O.², RAUBER, J. S.³, CHAVES, J. N. F.¹, KOMMERS, G. D.³, FLÔRES, M. M.⁴, MAZZANTI, A.³, BECKMANN, D. V.⁴

1- MV, Serviço de Neurologia e Neurocirurgia Veterinária (SNNV) - Hospital Veterinário Universitário(HVU), Pós-graduação em Medicina Veterinária, UFSM. Santa Maria – RS - miwa.sekita@acad.ufsm.br
2- MV, CENOV. Caxias do Sul - RS
3- MV, SNNV-HVU, Professor titular, UFSM. Santa Maria – RS
4- MV, SNNV-HVU, Professor adjunto, UFSM. Santa Maria – RS

INTRODUÇÃO

RETROPERITONEAL NEUROENDOCRINE TUMOR WITH SPINAL CORD INVOLVEMENT IN A YOUNG GERMAN SHEPHERD DOG – A CASE REPORT

POLIDORO, D. MV, MSc, Dipl. ECVN, AniCura DAP Plantijn te Berchem. Antwerpen, Belgium
DE COCK, H. MV, Dr., Dipl. ACVP, Zoolyx. Aalst, Belgium
MAZZANTI, A. MV, MSc, Dr., Dep. de Clínica de Pequenos Animais, UFSM. Santa Maria, RS
dakir.polidoro@anicura.be

- ANTERIOR
- INÍCIO
- PRÓXIMO

Introduction

Neuroendocrine tumors (NETs), including pheochromocytomas and paragangliomas, are often benign but with a high capacity for local invasion. They are infrequent and can be primary or metastatic, with primary retroperitoneal NETs being exceptionally rare. Only a few cases of primary extra-vertebral NETs, involving secondarily the vertebral canal have been reported in dogs.

